

**NYERI MELAHIRKAN (PERSALINAN NORMAL DENGAN KETUBAN  
PECAH DINI) PADA NY.S DI RUANG CEMPAKA RUMAH SAKIT TK II  
KARTIKA HUSADA KUBU RAYA TAHUN 2022**



**KARYA ILMIAH AKHIR (KIA)  
ILMU KEPERAWATAN MATERNITAS**

**Oleh :**

**Ema Siti Aisa**

**NIM SRP22319038**

**PROGRAM STUDI NERS**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN BARAT**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SIDANG KARYA ILMIAH AKHIR**

Judul Karya Ilmiah Akhir : Nyeri Melahirkan (Persalinan Normal dengan Ketuban Pecah Dini) pada Ny.S di Ruang Cempaka Rumah Sakit Tk II Kartika Husada Kubu Raya Tahun 2022

Nama : Ema Siti Aisa

NIM : SRP22319038

Program Studi Ners : Profesi Ners Keperawatan Reguler A

Menyetujui,  
Pembimbing



Ns. Hidayah, M. Kep  
NIDN: 1114088601

**LEMBAR PENGESAHAN**

Oleh :

Ema Siti Aisa

NIM: SRP 22319038

Telah dipertahankan dihadapan dewan Penguji Karya Ilmiah Akhir

Program Studi Ners Kelas Reguler A

Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat

Tanggal : 12 November 2022

Disetujui,

Pembimbing



Ns. Hidayah, M. Kep  
NIDN: 1114088601

Penguji



Ns. Surtikanti, M. Kep  
NIDN: 1108048101

Mengetahui,  
Ketua Prodi Studi Ners



Ns. Indah Dwi Rahayu, M. Kep  
NIDN: 1124058601

**ITEKES MUHAMMADIYAH KALBAR PROGRAM STUDI NERS  
KEPERAWATAN**

**Karya Ilmiah Akhir, Januari 2022**

**Ema Siti Aisa**

**Nyeri Melahirkan (Persalinan Normal dengan Ketuban Pecah Dini) pada Ny.S  
di Ruang Cempaka Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada Kubu Raya Tahun 2022**

**ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Ketuban pecah dini (KPD) atau *premature rupture of membranes* (PROM) merupakan robeknya membran ketuban yang dapat terjadi pada ibu sebelum melewati waktu persalinan. Prevalensi KPD di dunia mencapai 2-10% dan KPD mempengaruhi sekitar 5-15% dari kehamilan, Indonesia terdapat sekitar 4,5% sampai 7,6% dari keseluruhan angka kehamilan. Proses persalinan turut disertai rasa nyeri, nyeri melahirkan dapat menimbulkan cemas hingga stress, dan dalam keadaan nyeri persalinan tidak terkontrol dapat menyebabkan hiperventilasi. Kasus utama yang dijadikan subjek dalam penerapan asuhan keperawatan pada stase maternitas adalah Nyeri Melahirkan (Persalinan Normal dengan Ketuban Pecah Dini).

**Tujuan:** Tujuan dari penyusunan karya ilmiah akhir ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan maternitas yang berfokus pada penerapan asuhan keperawatan dengan masalah Nyeri Melahirkan (Persalinan Normal dengan Ketuban Pecah Dini) pada Ny.S di Ruang Cempaka Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada Kubu Raya Tahun 2022.

**Metode:** Kasus Asuhan Keperawatan Intranatal di ruang bersalin Cempaka Kartika Husada Kubu Raya dengan masalah keperawatan utama adalah nyeri melahirkan.

**Hasil:** Data pengkajian didapatkan klien mengeluh nyeri, pada kala I, II dan III nyeri akibat kontraksi uterus dengan skala nyeri 7-8, pada kala IV nyeri akibat luka episiotomi dengan skala 7. Klien tampak gelisah dan cemas, tanda vital dalam rentang normal disetiap kala. Diagnosis dalam kala I ialah nyeri melahirkan b.d dilatasi serviks dan ansietas b.d krisis situasional, dalam kala II ialah nyeri melahirkan b.d pengeluaran janin, dalam kala III ialah nyeri melahirkan b.d pengeluaran plasenta dan resiko perdarahan d.d persalinan, dalam kala IV ialah nyeri akut b.d agen pencedera fisik dan kelelahan b.d kondisi fisiologis. Intervensi yang direncanakan dalam kala I-IV ialah manajemen nyeri, reduksi ansietas, pencegahan perdarahan, dan manajemen energi. Seluruh intervensi di implementasikan sesuai diagnosis yang muncul dalam setiap kala. Evaluasi didapatkan diagnosis keperawatan yang teratasi 5, tidak terjadi 1, dan teratasi Sebagian 1.

**Kata kunci:** Asuhan keperawatan, nyeri melahirkan, intranatal, KDP

## **ABSTRACT**

**Background:** *Premature rupture of membranes (PROM) is a tearing of the amniotic membranes that can occur in the mother before passing the time of delivery. The prevalence of KPD in the world reaches 2-10% and KPD affects around 5-15% of pregnancies, in Indonesia there are around 4.5% to 7.6% of the total pregnancy rate. The labor process is also accompanied by pain, childbirth pain can cause anxiety to stress, and in uncontrolled labor pain it can cause hyperventilation. The main case that is used as a subject in the application of nursing care at the maternity stage is Painful Childbirth (Normal Labor with Premature Rupture of the Membranes).*

**Purpose:** *The purpose of compiling this final scientific work is to provide an overview of the implementation of maternity nursing care that focuses on the application of nursing care with the problem of Painful Childbirth (Normal Labor with Premature Rupture of the Membranes) for Mrs.S in the Cempaka Room, Tk Hospital. II Kartika Husada Kubu Raya in 2022.*

**Methods:** *Cases of Intranatal Nursing Care in the delivery room of Cempaka Kartika Husada Kubu Raya with the main nursing problem being labor pain.*

**Results:** *Assessment data found that the client complained of pain, in stages I, II and III pain due to uterine contractions with a pain scale of 7-8, in stage IV pain due to an episiotomy wound with a scale of 7. The client looked restless and anxious, vital signs were in the normal range every when. Diagnosis in stage I is labor pain related to cervical dilatation and anxiety related to situational crisis, in stage II is labor pain related to fetal expulsion, in stage III is labor pain related to placental expulsion and risk of bleeding during labor, stage IV is acute pain related to injury agents physical and fatigue related to physiological conditions. Interventions planned in stages I-IV are pain management, anxiety reduction, bleeding prevention, and energy management. All interventions are implemented according to the diagnosis that appears at any time. The evaluation obtained nursing diagnoses that resolved 5, did not occur 1, and partially resolved 1.*

**Keywords:** *Nursing care, birth pain, intranatal, KDP*